

按照说明书用药

请按医嘱用药

按时按量用药

药师在您身边



药葫芦娃官方微信



2023 “全国安全用药月”

安全用药 健康为民

**药是治病的，还
会添病吗？**



主办单位

国家药品监督管理局

承办单位

各省、自治区、直辖市药品监督管理局
新疆生产建设兵团药品生产监督管理局



中国药学会

CHINESE PHARMACEUTICAL ASSOCIATION

药是治病的，还会添病吗？

用药也能用出病来吗？答案是肯定的，这种由于药物诱发的疾病叫“药源性疾病”。在药物用于诊断和治疗疾病时又成为致病因子，引起与治疗作用无关的药物不良反应，可造成某种疾病状态或器官及局部组织发生功能性、器质性损害。如庆大霉素引起的神经性耳聋等。

药源性疾病比药物不良反应要严重，如果发现的早、治疗及时，绝大多数可以减轻症状或者痊愈。但若不能早发现，耽误了治疗和抢救的时机，则可能引起不可逆转损害，甚至终身致残，直至死亡等。

药源性疾病的基本类型：

(1) 中毒型

有些药物本身就对机体细胞有毒性作用和酶抑制作用等，一次过量或慢性蓄积都会导致药物中毒。

(2) 炎症型

特别多见，如一些药物可引起不同类型的药物性皮炎。

(3) 胚胎型

妊娠三个月内孕妇使用一些对胚胎有损害的药物，就可能引起胎儿畸形或某些脏器发育不全。

(4) 增生型

苯妥英钠等常可引起牙龈增生，尤以儿童患者为多见。

(5) 发育不全型

如四环素引起牙齿釉质发育不全等。20 世纪 70 年代我国城乡应用四环素极普遍，造成如今不少青年人的黄牙黄染。

(6) 萎缩型

如长期使用皮质激素后，可使局部皮肤发生萎缩，表皮乳突消失，表皮变薄。

(7) 变性浸润型

如 D- 青霉胺治疗可引起天疱疮样皮炎。

(8) 血管血栓型

药物性变态反应时可发生血管神经性水肿及充血；而反复多次使用血管造影剂可引起血管栓塞。

(9) 功能型

药物能引起机体功能性改变的现象很多。如有报道，目前临床上应用较多的新型胃肠动力药多潘立酮，可能会抑制性功能。

(10) 赘生与癌变型

如大量使用氮芥治疗时可引起膀胱癌；久用砷剂者可使掌、跖部产生赘生物，还可能演变成癌。